



### Le fortifiant pour la parfaite réussite de l'ensilage

La combinaison de bactéries lactiques homofermentaires et hétérofermentaires spécialement adaptée au maïs et aux plantes entières, pour la sécurité du processus de fermentation. Une stabilité aérobie accrue, par la formation d'acide acétique contrôlée. De plus, BONSILAGE MAIS améliore la digestibilité des nutriments et par conséquent la densité énergétique dans le fourrage. Dans la moyenne des essais, une augmentation de la teneur énergétique de l'ordre de +0,27 MJ NEL/kg de substance sèche a pu être mise en évidence.

#### Domaine d'utilisation:


Ensilage de maïs plantes entières 28-35 % de MS,  
Céréales plantes entières 30-40 % de MS

#### Durée de conservation minimum:

6-8 semaines


#### Plus de stabilité avec BONSILAGE MAIS

Stabilité aérobie en heures



#### Digestibilité accrue des nutriments avec BONSILAGE MAIS

Digestibilité en %



BONSILAGE GRAIN



### L'agent d'ensilage biologique pour des céréales de valeur

La combinaison de bactéries lactiques homofermentaires et hétérofermentaires hautement actives pour l'ensilage de céréales broyées et le maïs en grains dans le silo ou en silo-boudin. Protection des céréales contre les parasites issus de la fermentation des moisissures et des levures, notamment ; et, avec un spectre optimal d'acides fermentaires.

#### Domaine d'utilisation:

Céréales humides broyées et maïs en grains avec 60-75 % de MS

#### Durée de conservation minimum:

8 semaines



### La protection des nutriments des ensilages de grains de maïs et de Corn Cob Mix (CCM)

L'agent d'ensilage biologique spécial, constitué de bactéries lactiques homofermentaires et hétérofermentaires pour la mouture de grains de maïs et le CCM. BONSILAGE CCM protège contre la multiplication incontrôlée des levures et des moisissures et améliore la stabilité aérobie des ensilages.

#### Domaine d'utilisation:

ensilage de maïs en grains 58-68 % de MS,  
CCM 58-65 % de MS

#### Durée de conservation minimum:


8 semaines

BONSILAGE CCM


**NOUVEAU**

### BONSILAGE GRAIN abaisse durablement le pH

(orge concassée)



### Une stabilité élevée et moins de pertes avec BONSILAGE CCM



# La diversité, facteur clé du succès



L'agent d'ensilage numéro un en Europe

BONSILAGE MAIS



### Le produit de base qui a fait ses preuves

Le généraliste avec des bactéries lactiques homo-fermentaires soigneusement sélectionnées abaisse le pH rapidement et de manière fiable. Le résultat: des ensilages particulièrement appétents et très digestes, pour le rendement optimal du fourrage de base.

#### Domaine d'utilisation:


Graminées et trèfle avec 22-45 % de MS, luzerne avec 30-40 % de MS

#### Durée de conservation minimum:

2-3 semaines



### BONSILAGE améliore l'ingestion de fourrage



### Le plus en stabilité et en énergie

Combinaison de cinq souches de bactéries lactiques hétérofermentaires et homofermentaires spécialement ciblée pour une teneur élevée en MS (> 30 %). BONSILAGE PLUS augmente la densité énergétique dans l'ensilage par une digestibilité améliorée et réduit le post-échauffement, par inhibition des levures et des moisissures.

#### Domaine d'utilisation:


herbe, trèfle, luzerne, seigle vert, plantes entières; > 30 % de MS

#### Durée de conservation minimum:

6-8 semaines



### Ensilage stable avec BONSILAGE PLUS



### Le spécialiste des graminées riches en glucides

La combinaison performante de bactéries lactiques homo-fermentaires et hétérofermentaires pour des ensilages extrêmement digestes et à stabilité aérobie, réalisée avec des graminées riches en glucides. Réduction des teneurs en sucres résiduels, par transformation ciblée du sucre végétal en acides fermentaires préservant la qualité. Diminution du risque de post-fermentation.

#### Domaine d'utilisation:

prairie naturelle et pâture temporaire avec un taux élevé de graminées riches en glucides (graminées tétraploïdes) et > 30 % de MS


#### Durée de conservation minimum:

6-8 semaines

**NOUVEAU**

### BONSILAGE EXTRA transforme le sucre en acides fermentaires préservant la qualité

(espèce Delphin, Norddeutsche Saaten Union)



### Réussir son ensilage avec de basses teneurs en MS

Combinaison de souches homofermentaires, avec une action spéciale inhibant les clostridies pour les basses teneurs en MS (> 18 %). BONSILAGE FORTE abaisse le pH rapidement et de manière fiable et assure la qualité protéinique.

#### Domaine d'utilisation:

ray-grass avec 23-35 % de MS, autres graminées 25-35 % de MS, trèfle 25-35 % de MS, luzerne 30-35 % de MS


#### Durée de conservation minimum:

2-3 semaines



### BONSILAGE FORTE abaisse durablement la teneur en spores

(herbe, 1<sup>er</sup> coupe, 26-32 % de MS; Ø de 3 essais)



BONSILAGE EXTRA

BONSILAGE FORTE

## La diversité, facteur clé du succès

Les fondements de cette réussite reposent sur un savoir-faire et une expérience de plus de 10 ans dans la recherche et le développement. Le résultat : des combinaisons de souches intelligentes, constituées de bactéries lactiques spécialisées. La diversité Bonsilage offre des solutions performantes pour tous les types de fourrage de base.



L'agent d'ensilage numéro un en Europe