

Anmischanleitung für BONSILAGE-Produkte



Abb. 1.

Den Anmischbehälter bis zur Füllstandsmarke oder den Eimer mit sauberem, kaltem Wasser (10-20°C) füllen.



1a.

Abb. 1a. Den Eimer:

- bei Einsatz eines 100 g BONSILAGE-Gebinde mit 2,5 Liter je Gebinde füllen.
- bei Einsatz eines 400 g BONSILAGE-Großgebände mit 10 Liter Wasser füllen.



Abb. 2. u. 2a

BONSILAGE-Pulver in den Anmischbehälter oder Eimer füllen.



2a.



Abb. 3. Lösung ca. 15 Sekunden kräftig schütteln.

Abb. 3a. BONSILAGE im Eimer mit einem Schneebesen; Stabmixer oder Wendelrührer gleichmäßig auflösen

Tipp: Überschwappen vermeiden
Bei Einsatz eines Wendelrührers an einem Akkuschauber, nur mit geringer bis mittlerer Drehzahl arbeiten.



3a.



Abb. 4. 4a, 4b. Angerührtes BONSILAGE in den Dosierbehälter umfüllen und bei Bedarf mit der benötigten Dosenanzahl für die gewünschte Erntemenge ergänzen, mit der erforderlichen Wassermenge (siehe Dosieranleitung) auffüllen und nochmals kräftig schütteln.

Tipp: Zum sauberen Befüllen der Dosierbehälter einen Siebtrichter einsetzen



4a.



4b.

HINWEIS: Bei Anmischen von BONSILAGE im Anmischbehälter ist ein unmittelbares Auffüllen mit der Wassermenge bis zur Ziel-Dosierkonzentration und anschließendes Überführen in das Dosiergerät sicherzustellen, ansonsten kann es zu Schleimbildung kommen.