SCHAUMANN
ALLEVA IL SUCCESSO

BONSILAGE SPEED G

Tempi di insilamento indubbiamente più brevi!

CATEGORY 2
CONTINUOUS MONITORING
SUPPLEMENTARY TEST
✓ For early silo opening
DLG Certificate 7265

Alimentate i vostri animali con insilati ricchi di energia e stabili dopo sole due settimane di maturazione dell'insilato! Bonsilage Speed G lo rende possibile: grazie all'esclusivo ceppo batterico per insilati *Lactobacillus diolivorans*, una esclusiva di Schaumann. Questo ceppo, in collaborazione con gli altri ceppi di batteri lattici omo- ed etero-fermentanti, impedisce il riscaldamento e le fermentazioni anomale. È garantita un'elevata ingestione alimentare e si hanno anche i vantaggi di una maggiore flessibilità quando si utilizza il foraggio.

Disponibile anche nella versione certificata per l'agricoltura biologica.

BONSILAGE SPEED G

- garantisce un intenso processo di fermentazione dell'insilato nelle prime settimane
- migliora la stabilità aerobica dopo appena 2 settimane di maturazione dell'insilato
- previene il riscaldamento
- *L. diolivorans*: l'unico ceppo a livello UE autorizzato per questo tipo di metabolismo innovativo

Impiego e dosaggio

Condizioni d'impiego:
Insilati di graminacee , trifoglio e segale verde con 28 - 50 % SS

Dosaggio:
Con 2 g/t si applicano 250.000 UfC/g foraggio.

Confezioni:
100 g per 50 t TQ
400 g per 200 t TQ

Durata minima di stoccaggio: 14 giorni

1 **Apertura dell'insilato in sicurezza dopo soli 14 giorni: Estensione del periodo di stabilità aerobica di ben 3 giorni!**



BONSILAGE SPEED G 6,8 giorni



Controllo 3,7 giorni

Fonte: DLG-Versuchszentrum Betriebsmittel und Technik, 2022

2 **Ottimizza lo spettro degli acidi di fermentazione del vostro insilato dopo soli 14 giorni di maturazione, rispetto a quanto avviene in un insilato non trattato.**

58%
più acido acetico dopo soli 14 giorni

21%
più acido lattico dopo soli 14 giorni

Fonte: DLG-Versuchszentrum Betriebsmittel und Technik, 2022